

Фенкарол®

Схема приема¹

1 таблетка • 50 мг • 2 раза в день

Максимальная суточная доза 200 мг

Инъекции • 2 мл в/м • 8* дней



10–20 дней¹
курсы можно повторять

*Терапия острой крапивницы.

1. ОХЛП препарата Фенкарол® 50 мг ЛП-Н-(003370)-(PF-RU) от 09.10.2023. Соответствует экспертному отчету от 05.10.2023 № 19635.

ИМП Фенкарол® 10 мг, р-р для в/м введения от 05.08.2021

2. Ненашева Н. М. и соавт. Резолюция Совета экспертов «Место хифенадина в терапии аллергических заболеваний и классификации антигистаминных препаратов». Фарматека. Том 30, № 8, 2023

3. Орлов В. и соавт. Клинический опыт применения антигистаминных производных хинуклидина в комплексной терапии зудящих дерматозов. КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 6, 2014. с. 74–81

4. Bukovskis M, et al. H1-antihistamines suppress wheal-and-flare reaction and skin blood perfusion measured by laser doppler flowmetry: randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover design study. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 2010;64(5/6):175-181

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников.

TELERA PHARMA

ООО «Телера-Фарма»
125212, г. Москва, Головинское ш., д. 5, к.1,
этаж 2, помещ. 2137А, бизнес-центр «Водный»
Тел.: +7 (499) 551-51-10
info@telerapharma.ru



TPhFEN0482 04.12.2024

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ

ЗУДА



УКРОЩЕНИЕ


ЗУДА

Фенкарол® способствует снижению выраженности зуда **в 3 раза**³



Снижение выраженности симптомов уже **в первые дни приема**³

Динамика изменения кожного зуда на фоне терапии Фенкаролом (баллы ВАШ)³



Фенкарол® – **тройное действие** против зуда и аллергии^{1,2}



Блокада **гистаминовых** рецепторов



Активация **гистаминазы**



Блокада **серотониновых** рецепторов

Фенкарол® для тех, кто хочет **остаться активным**



Седативный эффект хифенадина **сопоставим с плацебо**^{2,4}



Не усиливает действие алкоголя¹



Способствует устранению зуда и сохранению **привычного образа жизни**^{1,2}